

Votre Intervention : Pose de Chambre Implantable (PAC)

Fiche d'information et consignes de sécurité – Dr Thierry WATRIN

Madame, Monsieur,

Vous allez bénéficier de la pose d'une chambre implantable (PAC). Cette fiche regroupe les consignes essentielles pour le bon déroulement de l'intervention.

1. Préparation Indispensable (Avant l'arrivée)

Le Jeûne (Règles impératives)

- **Solides et Tabac** : Vous devez être à jeun (ne pas manger, ne pas fumer) au moins **6 heures avant** l'intervention.
- **Liquides clairs** : Vous pouvez boire de l'eau, du thé ou du café (sans lait) jusqu'à **2 heures avant** l'heure prévue.

Questionnaire d'Anesthésie

- **Action** : Vous devez impérativement **remplir le questionnaire d'anesthésie** remis lors de votre pré-admission. Ce document est indispensable pour la consultation flash au bloc opératoire.

Traitements Anticoagulants / Antiagrégants

Si vous prenez des médicaments pour "fluidifier le sang" (Aspégic, Kardégic, Plavix, Previscan, Eliquis, Xarelto, etc.) :

- **Action** : Si vous n'avez pas de protocole d'arrêt, contactez impérativement **Mme Emma GUERIN** au ☎ **01 39 17 50 95**.

2. Le jour de l'intervention

Déroulement et Sécurité

- **Anesthésie** : Locale associée à une sédation (relaxants) pour un confort total.
- **Durée** : L'intervention dure environ **15 à 20 minutes**.
- **Contrôle** : Ponction sous **écho-guidage**. Une **radio de contrôle** est effectuée systématiquement avant votre sortie.
- **Sortie** : Prévue environ **2 heures après** le geste.

Retour à domicile

- **Accompagnement obligatoire** : En raison de la sédation, vous ne pouvez pas quitter l'établissement seul. Prévoyez un proche ou un **taxi conventionné**.
- **Conduite** : Interdite pendant les 24 heures suivant l'anesthésie.

3. Soins Post-Opératoires (À domicile)

1. **Le Pansement** : À retirer dès le lendemain (**J1**). La cicatrice reste à l'air libre.
2. **La Douche** : Autorisée dès le lendemain (**J1**). Savonnez doucement et séchez en tapotant.
3. **Les Strips (Adhésifs)** : Ne les retirez pas. Appliquez la solution **Serozinc** une fois par jour après la douche.
4. **Reprise de traitement** : Reprenez votre traitement anticoagulant habituel dès le lendemain (**J1**) sauf avis contraire.

 **Urgences 24h/24 (Clinique de l'Europe - Port-Marly) :  01 39 17 24 24**